

Particella n°: V

Località:	Casera Bregolina
Proprietà:	regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune:	Cimolais
Altitudine	
	Max Med Min
	2.000 1.915 1.830

Superfici, ha

Valori gestionali:	
Sup. boscata:	0,7164
Sup. senza vegetazione:	-
Sup. inclusa non bosc.:	13,8000
Sup. totale:	14,5164
Sup. totale catastale:	14,1896

Esposizione:	Sud-Est
Pendenza:	Poco inclinato
Posizione:	Dorsale, alto versante
Accidentalità:	Media
Gruppo di substrati:	Dolomitico
Substrato geol.:	calcarei e dolomie grigio scuri, con selce e livelli marnosi cm; breccie dolomitiche alla base o in corpi irregolari all'interno (Fm. di Soverzene); encriniti rossastre (encrinite di Fanes); calcari micritici e marnosi varicolori, nodulari, in strati dm; Dolomie chiare, cristalline, in strati dm organizzate in cicli peritidali (Dolomia Principale); localmente, al tetto dell'unità, breccie dolomitiche

Tipo di suolo:	Cambisols
----------------	-----------

Descrizione del soprassuolo:

Particella di pascolo comprendente i pascoli d'alpeggio di Casera Bregolina Grande. Pascoli a colico compatto ricchi di specie che si sviluppano su suoli ricchi di sostanza organica. Prevengono le specie tipiche del pascolo pingue d'alta quota fra le quali: *Carex sempervirens*, *Horminum pyrenaicum*, *Festuca pumila*. A valle della casera, in corrispondenza di aree umide prendono il sopravvento i cariceti, *Carticion ferrugineae*. Il lungo abbandono del pascolo (sino agli anni '80 monticavano dai 120 ai 180 capi di bestiame bovino) è testimoniato dall'ingresso di specie arbustive, *Rhododendron hirtutum*, *Sorbus chamaespilus*, che precludono, in assenza di sfalci o di alpeggio, ad una lenta ma inesorabile chiusura del pascolo.

La Casera, ristrutturata da circa 10 anni è in ottimo stato ed ha essenzialmente funzione di rifugio per escursionisti.

Fauna: sono presenti popolazioni di marmotta (*Marmota marmota*), nei boschi circostanti il pascolo è inoltre presente la civetta nana (*Glaucidium passerinum*).

Presenza di Faglano di monte